

OCORRÊNCIA DE ANOPHELES (*STETHOMYIA*) NIMBUS (THEOBALD, 1903) (DIPTERA, CULICIDAE) NO AMBIENTE DOMICILIAR, NA ÁREA URBANA DE GOIÂNIA, GOIÁS, BRASIL

Marlene de Fátima Camargo*, Ionizete Garcia da Silva**,
Eliana Isac**

A cidade de Goiânia encontra-se infestada por várias espécies de mosquitos e a população tem sido molestada pela ação hematofágica de algumas dessas, além disso, existe a possibilidade de transmissão de doenças, tais como a dengue e a febre amarela. Para obter soluções e propor medidas de combate ou controle, está sendo realizado um estudo da fauna de mosquitos da área urbana de Goiânia. Para isto, montaram-se, pelos técnicos da Fundação Nacional de Saúde, cinco estações de coleta, sendo duas na parte central e três em área periférica da cidade. Das coletas realizadas, relata-se, pela primeira vez no peridomicílio na área urbana de Goiânia, a ocorrência de *Anopheles (Stethomyia) nimbus*, capturado na estação localizada na Vila Rosa, parte norte da cidade. Nesta, foram capturadas duas fêmeas de *A. nimbus*, no mês de março, usando-se a barraca de Shannon, e, duas fêmeas em abril, e três em junho, usando-se isca humana. Nas estações, as capturas estão sendo realizadas duas vezes por semana, das 8h a 20h, e as fêmeas desse anofelino foram capturadas no período entre 18 e 19h.

O *A. nimbus* possui hábito silvestre, e se cria em alagadiços e em pântanos bem sombreados. Sua biologia é praticamente desconhecida. Suga o homem e animais, mas pouco se sabe sobre suas preferências. No local da captura e no entorno desta, não houve condição favorável similar à anteriormente citada, o que permite supor que este anofelino se adaptou ao ambiente modificado pelo homem. Nesse trabalho, *A. nimbus* apresentou comportamento sinantrópico e antropofílico.

* Biomédica - Fund. Nac. Saúde - Goiânia-Go.

** Profs. Dept.º Parasitologia - IPTSP/UFG.