

OCORRÊNCIA DE INSETOS ANOPHELÍNIOS EM
NA ALIMENTAÇÃO
OUTRAS ESPÉCIES DE LUTZOMYIA (FRANÇA, 1924) (DIPTERA,
PSYCHODIDAE) EM GOIÂNIA-GOIÁS

Maria Elisa Santos Dourado Carvalho*, Heloisa Aparecida Machados Naves**,
Jacqueline Alves da Costa***

Em continuidade aos estudos sobre a fauna de flebotomíneos em Goiânia, notifica-se o encontro de outras 5 espécies totalizando 10 coletadas nos anos de 1987, 1988, 1991 e 1992.

Obtiveram-se através de iscas humana e animal e armadilhas luminosas (Shannon e CDC) as seguintes espécies: *Lu. bacula* (Martins, Falcão e Silva, 1965); *Lu. damascenoi* (Mangabeira, 1941); *Lu. lenti* (Mangabeira, 1938); *Lu. saulensis* (Floch & Abonnenc, 1944) e *Lu. spinosa* (Floch & Abonnenc, 1942).

Os flebotomos foram identificados segundo FORATTINI (1973), MARTINS, WILLIAMS & FALCÃO (1978), RYAN (1986) e YOUNG & FAIRCHILD (1974).

A diversidade de espécies encontradas no local trabalhado justifica os estudos sobre a biologia das mesmas.

* Bióloga Dept.º Parasitologia IPTSP/UFG - Caixa Postal 131, Goiânia.

** Prof.º Dept.º Parasitologia IPTSP/UFG.

*** Estagiária seção Entomologia IPTSP/UFG.