

ARTRÓPODES PARASITOS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS DO ESTADO DE GOIÁS

Edia Sena Lustosa *, Maria Elisa Santos Dourado Carvalho **
José Roberto Carneiro *, Ionizete Garcia da Silva *

INTRODUÇÃO

O estudo dos artrópodes que parasitam os animais domésticos do Estado de Goiás foi iniciado por Lustosa & Cols. (1973), que relataram a prevalência dos seguintes parasitos em cães vadios de Goiânia: *Ctenocephalides felis felis*, 45%; *Pulex irritans*, 2,5%; *Nosopsyllus fasciatus*, 2,5%; *Heterodoxus longitarsus*, 42,5%; *Linognathus setosus*, 2,5%; *Rhipicephalus sanguineus*, 67,5%. Carneiro & Cols. (1975), em Goiânia, constataram os seguintes percentuais de ocorrência de parasitos em pombos: *Columbicola columbae*, 80%; *Goniocotes bidentatus*,

66%; *Pseudolynchia maura*, 13%; *Falculifer rostratus*, 10%.

Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma lista de artrópodes parasitos dos animais domésticos do Estado de Goiás.

Os artrópodes aqui relacionados ou já foram citados por outros autores ou são provenientes de trabalhos realizados no Departamento de Parasitologia do IPT-UFG., no período 1973-1981.

Os espécimes estudados foram colhidos, fixados e corados de acordo com os métodos usuais em Parasitologia.

* Prof. Assistente do Departamento de Parasitologia do I. P. T. da U. F. G.

** Biologista do Departamento de Parasitologia do I. P. T. da U. F. G.

BOVINO (BOS TAURUS LIN)

GRUPO ZOOLOGICO	NOME CIENTÍFICO	LOCALIZAÇÃO /HOSPEDEIRO
<i>Classe Arachnida</i> (Lamarck, 1815)		
<i>Ixodidae</i> (Murray, 1877)	<i>Boophilus microplus</i> (Canestrini, 1888)	Pele
<i>Classe Insecta</i> (Linneu, 1758)		
<i>Haematopinidae</i> (Enderlein, 1904)	<i>Linognathus vituli</i> (Linneu, 1758)	Pele
	<i>Hematopinus eurysternus</i> (Nitzsch, 1818)	Pele
<i>Oestridae</i> (Linneu, 1758)	<i>Dermatobia hominis</i> (Linneu, 1781)	Tec. sub-cutâneo
<i>Tungidae</i> (Jordan, 1956)	<i>Tunga penetrans</i> (Linné, 1758)	Pele
<i>Calliphoridae</i> (Brauer, 1889)	<i>Cochliomyia hominivorax</i> (Coquerel, 1858)	Tec. sub-cutâneo
<i>Muscidae</i> (Leach, 1819)	<i>Stomoxys calcitrans</i> (Geoffroy, 1762)	Pele

CAVALO (EQUUS (EQUUS) CABALLUS LIN)

GRUPO ZOOLOGICO	NOME CIENTÍFICO	LOCALIZAÇÃO /HOSPEDEIRO
<i>Classe Arachnida</i> (Lamarck, 1815)		
<i>Psoroptidae</i> (Canestrini, 1892)	<i>Psoroptes equi</i> (Henrig, 1838)	Pele
<i>Ixodidae</i> (Murray, 1877)	<i>Boophilus microplus</i> (Canestrini, 1888)	Pele
	<i>Anocentor nitens</i> Neumann, 1897)	
<i>Classe Insecta</i>		
<i>Haematopinidae</i> (Enderlein, 1904)	<i>Hematopinus asini</i> (Linneu, 1758)	Crina

SUINOS (SUS SCROFA DOMESTICUS LIN)

GRUPO ZOOLOGICO	NOME CIENTÍFICO	LOCALIZAÇÃO /HOSPEDEIRO
<i>Classe Insecta</i> (Linneu, 1758)		
<i>Hematopinidae</i> (Enderlein, 1904)	<i>Hematopinus suis</i> (Linneu, 1758)	Pele
<i>Tungidae</i> (Jordan, 1956)	<i>Tunga penetrans</i> (Linneu, 1758)	Pele

CÃO (CANIS FAMILIARIS LIN)

GRUPO ZOOLOGICO	NOME CIENTÍFICO	LOCALIZAÇÃO /HOSPEDEIRO
<i>Classe Insecta</i> (Linneu, 1758)		
<i>Pulicidae</i> Stephens, 1829)	<i>Ctenocephalides felis</i> (Bouché, 1835)	Pele
	<i>Pulex irritans</i> (Linneu, 1758)	Pele
<i>Ceratophyllidae</i>	<i>Nosopsyllus fasciatus</i> (Box, 1801)	Pele
<i>Haematopinidae</i> (Leach, 1817)	<i>Linognathus setosus</i> (Olfers, 1816)	Pele
<i>Boopidae</i> (Mjooberg, 1910)	<i>Heterodoxus longitarsus</i> (Piaget, 1880)	Pele
<i>Calliphoridae</i> (Brauer, 1889)	<i>Cochliomyia hominivorax</i> (Coquerel, 1858)	Tec. sub-cutâneo
<i>Oestridae</i> (Leach, 1817)	<i>Dermatobia hominis</i> (Linneu, 1781)	Tec. sub-cutâneo
<i>Muscidae</i> (Leach, 1819)	<i>Stomoxys calcitrans</i> (Geoffroy, 1762)	Pele
<i>Classe Arachnida</i> (Lamarck, 1815)		
<i>Ixodidae</i> (Murray, 1877)	<i>Rhipicephalus sanguineus</i> (Latereille, 1806)	Pele
<i>Democididae</i>	<i>Demodex canis</i> (Leydig, 1859)	Folículos pilosos.

GALINHA (GALLUS GALLUS DOMESTICUS LIN)

GRUPO ZOOLOGICO	NOME CIENTÍFICO	LOCALIZAÇÃO /HOSPEDEIRO
<i>Classe Insecta</i> (Linneu, 1758) <i>Philopteridae</i> (Burmeister, 1838)	<i>Lipeurus caponis</i> (Linneu, 1758)	Pele
<i>Classe Arachnida</i> (Lamarck, 1815) <i>Dermanyssidae</i> (Kolenati, 1859)	<i>Dermanyssus gallinae</i> (De Geer, 1778)	Pele
<i>Macronyssidae</i> (Oudemans, 1936)	<i>Ornithonyssus bursa</i> (Berlese, 1888).	Pele

POMBO (COLUMBIA LIVIA DOMÉSTICA)

<i>Classe Insecta</i> (Linneu, 1758) <i>Hippoboscidae</i> (Leach, 1815)	<i>Pseudolynchia maura</i> (Bigot, 1885)	Pele
<i>Philopteridae</i> (Burmeister, 1838)	<i>Columbicola columbae</i> (Linneu, 1758) <i>Goniocotes bidentatus</i> (Scopoli, 1763, 1763)	Pele
<i>Classe Arachnida</i> (Lamarck, 1815) <i>Sarcoptidae</i>	<i>Falculifer rostratus</i> (Buchholz)	Pele

SUMMARY

The authors list in this work all the arthropods that have been found parasitizing domestic animals, in the state of Goiás, Brazil.

H. V. - Ectoparasitos de cães vadios de Goiânia. *Rev. Pat. Trop.* 2(4): 397-399.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

01 - LUSTOSA, E. S.; CARNEIRO, J. R.; CARVALHO, M. E. D. & JARDIM, J.

02 - CARNEIRO, J. R.; LUSTOSA, E. S.; PEREIRA, E.; CARVALHO, M. E. D. & NAPOLI, M. A. - Incidência de ecto e endoparasitos de Pombos (*Columbia livia domestica*) de Goiânia. *Rev. Pat. Trop.* 4(1): 39-41.